

УДК 1

Атабаева М.С.

Ташкетский государственный аграрный университет

**ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЕ В ФОРМЕ АММИАКА
НА ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ ХЛОПЧАТНИКА СОРТА
АНДИЖАН-36**

Аннотация: в результате исследования выявлено что, новый комбинированный технология обработки почвы, оказала положительного влияния даже при возделывания самый более 140-150 тыс/га густоты стояния и способствовало интенсивного цветение и накопление плод элементов сорта хлопчатника Андижан-36 и создавала возможность получению высокого и качественного урожая хлопка сырца.

Ключевые слова: the number of horses, as a result of flowering, harvesting and accelerating process, lumpu.

Из-за нестабильных засушливых климатических условий в Андижанской области в последние годы способность существующих технологий снижалась в связи с проблемой нехватки воды. Многочисленные исследования были проведены по таким вопросам и были введены в производство. Например, для улучшения почвенных условий и повышения эффективности использования рудных удобрений технология сушки аммиака осенью (0-30 см) была обусловлена основной движущей силой.

В посевных сортах температура верхнего слоя почвы была на 1,5-5,0 ° С выше точки сглаживания семян. Кроме того, в результате процессов цветения, сбора урожая и ускорения количество лошадей увеличилось в 2-3 раза по сравнению с контролем [4].

В условиях Андижанской области новые технологии комбинирования для обработки почвы еще не изучены с точки зрения плодородия почвы, экономии влаги, эффективности удобрений, экономии воды и других факторов.

Исходя из этих проблем, опыт полевой работы фермы «Давр хамкорлик» в Кургантепском районе был реализован на основе применения аммиачных азотных

удобрений в процессе выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной технологии почвы до 2015-2017 гг.

Методы исследования. Экспериментальное поле - это замасленная почва, орошаемая заранее. Механическая композиция - средний песок. Вода реки на 2,0-3,0 м ниже нее. Щелочность почвенного раствора составляет 7-7,4, масса почвенного слоя почвы составляет 1,43 г / м³. Содержание гумуса и валового азота составляет 0,9-1,2 и 0,08-0,153% соответственно.

Экспериментальные варианты были помещены в 4-рядный ряд. Площадь участка 300 м², площадь участка 100 м². Всего было 48 вариантов. Все анализы и расчеты проводились в соответствии с «Методами проведения полевых практик» (2007). Экспериментальные данные были математически проанализированы в методе Б. Доспехова «Методология поляризации» (1985).

Результаты исследований. В новой комбайновой технологии осенью под листвой азот выращивают в разновидностях толщины (5-7 и 8-10) с содержанием азота 100 и 50% аммиака при 200 кг / га, а также ростом хлопка в Андижане-36, было определено, что конкретно.

В технологии, в сочетании с почвенными технологиями в 2015 году, осенью, под уровнем азота 200 кг / га, 100% и 50% аммиака под азотом осенью (в диапазоне 6-7, 9-10 Количество саженцев составляет 110 000 т / га (5,7) и 30-35 см в обычном порядке, при этом количество рассады составляет 3-4 дня раньше, чем 1-контрольный вариант с стоимостью посадки 95 000 тонн на га , на 3-4 дня раньше, чем 1-контрольный вариант толщины растения.

1.таблица.

Влияние агротемов на дни цветения в Андижане-36 (100 растений)

Вар	2015 йил		2016 йил		2017 йил	
	100 % цветок	За несколько дней до цветения	100 % цветок	За несколько дней до цветения	100 % цветок	За несколько дней до цветения

1	3.07	67	5.07	65	8.07	69
2	2.07	66	5.07	65	8.07	68
3	1.07	65	3.07	63	7.07	67
4	1.07	65	2.07	62	8.07	68
5	2.07	66	5.07	65	7.07	63
6	29.06	64	2.07	62	5.07	64
7	29.06	64	1.07	61	4.07	65
8	1.07	65	4.07	64	7.07	65
9	27.06	61	2.07	62	5.07	63
10	28.06	62	1.07	61	5.07	62

Осенью под листвой 100 и 50% годового азотного удобрения (200 кг / га) в форме аммиака, 129,7 и 149,2 тыс. Тонн / га, 6 и 7 посадок дают 95,6 и 94,6% выросли до 100% за 64 дня в 64 дня по сравнению с контролем за 3 дня до 29,06 (таблица 1). Осенью количество рассады, высаженной 50% аммиака в год годового азотного удобрения (200 кг / га) под бороздами, составляло 8,4% посаженных саженцев, 74,3% растений расцвели и 100% в 65 дней в 1.07.

Кроме того, количество рассады с толщиной 127,8 и 147,6 тыс. Туп / га и 9 и 10 вариантных сортов выросло до 94,8 и 96,9% растений и на 5-6 дней раньше, чем 27,06 и 28,06 соответственно. 100% каждый день.

В новой комбинированной технологии выращивания хлопка в 2016 году 3 июля, 80,0 посевных семян (2, 5, 8) семян, посаженных с добавлением фасоли, последний раз контролировали хлопок Андижана-36; 84,0 и 81,3%, тогда как количество рассады составляло 90,4-94,5% загущенных растений и выросло до 100% за 61-63 дня (28,06 и 1,07 дня) 3,6,1;). Влияние минеральных удобрений не наблюдалось. Количество рассады в вариантах разбавления (2, 5, 8), а цветение растений продолжалось до 4,07 и 5,07 дня и увеличилось до 100% за 4-5 дней на 64-65 дней (табл. 1).

Так обстоит дело с экспериментами 2017 года, и новая комбинированная технология выращивания хлопка Андижан-36, которая была посеяна на холмах, имеет потенциал для выращивания урожая зерновых культур и производства драгоценного и

качественного урожая хлопка, сохраняя при этом законы цветения в утолщенных вариантах рассады.

Таким образом, толщина саженцев была важна при цветении и уборке, и стало ясно, что это был важный фактор в выращивании урожая урожая. Кроме того, благодаря новой технологии выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной технологии обработки почвы были ускорены самые высокие урожаи процесса посадки и уборки урожая, появилась возможность производить высококачественный и высококачественный сбор хлопка.

Список литературы

Баранов А.А., Белоусов М.А., Решетников Ф.И. Приближения дзидкиков азотных правд в хлопководстве // Хлопководство, 1959, № 3, ул. 28-31

Мадраимов И.М., Торопкина А.Л. Сроки внесения жкихких азотных удобрений // Хлопководство, 1975, № 4, стр. 38-40

Кашкаров А.К., Файзиев Т.З. Гребневая культура хлопчатника // Сельское хозяйство Узбекистана, 1972, №2, стр.40-41.

Курбонтаев Р. Икрамов Дж. Посева хлопчатника по грядам и гребням в пустынной области Узбекистана. // Хлопководство, 1985г №10, стр. 15-16